

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Аскорутин

Регистрационный номер: P N000705/01

Торговое название препарата: Аскорутин

Группировочное название: Аскорбиновая кислота + Рутозид

Лекарственная форма: таблетки 50 мг + 50 мг

Состав: 1 таблетка содержит:

Действующие вещества: аскорбиновая кислота 50 мг, рутозид (рутин) 50 мг.

Вспомогательные вещества: сахароза (сахар) 120,6 мг, целлюлоза микрокристаллическая 76,3 мг, крахмал картофельный 26,9 мг, кальция стеарат 3,1 мг, тальк 3,1 мг.

Описание: таблетки светлого зеленовато-желтого цвета с незначительными вкраплениями, плоскоцилиндрической формы с фаской и риской.

Фармакотерапевтическая группа: витамин.

Код АТХ: [C05CA51].

Фармакологические свойства

Аскорбиновая кислота играет важную роль в регуляции окислительно-восстановительных процессов, углеводного обмена, свёртываемости крови, регенерации тканей, способствует повышению сопротивляемости организма. Рутин устраняет повышенную проницаемость капилляров, укрепляет сосудистую стенку, уменьшая её отёчность и воспаление. Обладает антиагрегантным действием, что способствует улучшению микроциркуляции.

Показания к применению

Гиповитаминоз аскорбиновой кислоты и рутозида. В составе комплексной терапии при варикозном расширении вен, трофических нарушениях и язвах кожи, при хронической венозной недостаточности; при геморрагическом диатезе.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст.

С осторожностью

Состояния, сопровождающиеся гиперкоагуляцией крови и склонностью к тромбозам, тромбофлебит.

Способ применения и дозы

Внутри по 1 таблетке 2-3 раза в сутки во время или после приема пищи. Курс лечения 2-3 недели.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции (кожная сыпь), диспепсические расстройства, головная боль.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов проявляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, **сообщите об этом врачу.**

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Аскорбиновая кислота повышает всасывание лекарственных средств группы пенициллина, железа; снижает клинический эффект гепарина и непрямых антикоагулянтов.

Особые указания

Не оказывает влияния на способность к управлению автомобилем, работу с точными и потенциально опасными механизмами.

Форма выпуска

Таблетки 50 мг + 50 мг.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку. По 5 контурных ячейковых упаковок с инструкцией по применению в пачку из картона. По 30 или 50 таблеток в банки полимерные. Банку с инструкцией по применению в пачку из картона.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель

ООО «РОЗЛЕКС ФАРМ», Россия

171261, Тверская обл., Конаковский район, пгт. Редкино, ул. Заводская, д. 1

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата для медицинского применения на принятие претензий от потребителя:

Представительство компании «РОУТЕК ЛИМИТЕД» (Великобритания) в России:

119571, г. Москва, просп. Вернадского, д. 94, корп. 5, офис 1

Тел.: +7 (495) 660 44 71

и/или

ООО «РОЗЛЕКС ФАРМ», Россия

171261, Тверская обл., Конаковский район, пгт. Редкино, ул. Заводская, д. 1

Тел.: +7 (499) 110-13-82

О развитии нежелательных реакций, связанных с приемом препарата сообщать:

Представительство компании «РОУТЕК ЛИМИТЕД» (Великобритания) в России:

119571, г. Москва, просп. Вернадского, д. 94, корп. 5, офис 1

Телефон бесплатной горячей линии:

8-800-600-51-77

e-mail: pv@rowtechrus.ru